

**Visuele perceptie bij schizofreniepatiënten. (lectuur in PDF-formaat)**

**Meerkeuzevragen:**

- 1) Tekorten op het vlak van retrograde markering die men bij schizofreniepatiënten ziet, zijn voornamelijk toe te schrijven aan problemen met de werking van de pathways in de parvocellulaire baan (of het verlengde) van het visuele proces.
- 2) 25-40% van gezonde ouders en familieleden in de eerste graad van patiënten met schizofrenie vertonen afwijkingen in volgbewegingen met de ogen.
- 3) De moeilijkheden die schizofreniepatiënten hebben om bewegingen continu te volgen met de ogen lijken voornamelijk gerelateerd aan een slecht functioneren van het systeem '*Smooth pursuit*'
- 4) De perceptie van 'biologische beweging' lijkt behouden bij schizofreniepatiënten
- 5) De problemen met '*perceptual closure*' zijn voornamelijk toe te schrijven aan een slechte werking van de magnocellulaire (of transitoire) weg van het visuele proces.

**Open vragen:**

Wat kunt u kort zeggen over de perceptie van gezichten bij schizofreniepatiënten?  
Welk probleem bij de visuele perceptie van schizofreniepatiënten lijkt een interessante endofenotyperende marker?